

		IQM Gesamt		Helfenstein n Kl. Geislinge n	Helfenstein Kl. Geislingen	Kl. am Eichert Göppinge n	Kl. am Eichert Göppingen
Träger	LandkGoeppingen			2008	Rate KH 2009	2008	Rate KH 2009
Zeitraum	2008 und 2009						
Qualitätsindikatoren	BQS Referenz	Rate IQM					
(09/1) Herzschrittmacher-Erstimplantation							
QI 1: Leitlinienkonforme Indikat. zur Schrittmacherimplant. bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90,0	96,3%	91,7%	90,0%	99,4%	98,2%	
QI 3: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90,0	96,7%	100,0%	85,0%	98,8%	100,0%	
QI 8: Perioperative Komplikationen, chirurgische Komplikationen	<=2,0	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	
QI 8: Perioperative Komplikationen, Ventrikelsondendislokation bei implantierter Ventrikelsonde	<=3,0	0,9%	6,7%	0,0%	1,8%	1,8%	
QI 8: Perioperative Komplikationen, Vorhofsondendislokation bei implantierter Vorhofsonde	<=3,0	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	
(10/2) Karotis-Rekonstruktion							
QI 1: Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose, Stenosegrad >= 60% (NASCET)	>=80,0	94,3%			84,1%	94,9%	
(12/1) Cholezystektomie							
QI 3: Erhebung eines histologischen Befundes, postoperativ	>=95	98,8%	98,6%	99,3%	99,0%	99,3%	
QI 7: Reinterventionsrate bei laparoskop. Operation (ASA 1-3 ohne Entzündungszeichen)	<=1,5	0,9%	1,0%	0,0%	0,0%	1,3%	
(15/1) Gynäkologische Operationen							
QI 6: Antibiotikaphylaxe bei Hysterektomie	>=90,0	97,1%	100,0%	100,0%	99,6%	98,8%	
QI 8: Thromboseprophylaxe bei Hysterektomie, Alter < 40 Jahre	>=95	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
(16/1) Geburtshilfe							
QI 3: EE-Zeit bei Notfallkaiserschnitt > 20 Minuten	=0	0,7%				0,0%	
QI 4: Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeborenen, vor Geburt	>=90,0	87,4%				96,6%	
QI 6: Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (pH < 7,0)	<=0,3	0,2%				0,2%	
QI 10: Antenatale Kortikosteroidtherapie, SSW 24+0 bis unter 34+0 Wochen, präpartal stationär >=	>=95,0	91,7%				66,7%	
(17/2) Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation							
QI 7: Endoprothesenluxation	<=5,0	0,4%	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%	
QI 8: Postoperative Wundinfektion	<=3,0	0,6%	0,0%	1,5%	0,9%	0,6%	
QI 11: Reinterventionen wegen Komplikation	<=9,0	1,6%	2,9%	3,8%	5,2%	4,1%	
(17/5) Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation							
QI 7: Postoperative Wundinfektion (alle)	<=2,0	0,4%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	
QI 10: Reinterventionen wegen Komplikation	<=6,0	1,3%	0,0%	0,9%	2,4%	5,9%	

BQS Qualitätsindikatoren

		IQM Gesamt		Helfenstei n Kl. Geislinge n	Helfenstei Kl. Geislingen	Kl. am Eichert Göppinge n	Kl. am Eichert Göppingen
Träger	LandkGoeppingen						
Zeitraum	2008 und 2009						
Qualitätsindikatoren	BQS Referenz	Rate IQM	2008	Rate KH 2009	2008	Rate KH 2009	
(18/1) Mammachirurgie							
QI 2: Intraoperatives Präparatröntgen	>=95	96,7%	100,0%	100,0%	100,0%	97,2%	
QI 3: Hormonrezeptoranalyse und HER-2/neu-Analyse, Histologie "invasives Mammakarzinom" und	>=95	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
QI 4: Angabe Sicherheitsabstand, Primärerkrankung „invasives Mammakarzinom oder DCIS“, Brust	>=95	97,2%	100,0%	88,0%	98,5%	97,5%	
QI 4: Angabe Sicherheitsabstand, Primärerkrankung „invasives Mammakarzinom oder DCIS“, Mast	>=95	95,5%	100,0%	91,7%	85,7%	95,5%	
(21/3) Koronarangiographie und perkutane Koronarintervention (PCI)							
QI 1: Indikation zur Koronarangiographie - Ischämiezeichen	>=80,0	94,2%			88,6%		
QI 3: Indikation zur PCI, ohne Nachweis von Ischämiezeichen bei Belastung	<=10,0	0,9%			2,4%		
QI 4: Alle PCI mit Indikation akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebung bis 24 h nach Stellung der Diag	>=85,0	94,6%			94,0%		
(HCH) Herzchirurgie - Koronarchirurgie, isoliert							
QI 1: Verwendung der linken A. mammaria int. (OP elektiv oder dringlich)	>=85	94,5%					
(PNEU) Ambulant erworbene Pneumonie							
QI 1: Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	>=95	94,1%	93,9%	97,6%	92,6%	96,3%	

Für die Messung, ob ein BQS-Ziel erreicht oder nicht erreicht wird, wird die Rate des Krankenhauses mit dem BQS-Ziel verglichen.

- BQS-Ziel erreicht
- BQS-Ziel nicht erreicht